

Eine
**Krebsoperation mit nachfolgendem plastischen
Ersatz des Defektes in zwei Zeiten.**

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrath Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à I. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Ferdinand Brüny

prakt. Arzt aus Bremen.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Eine
**Krebsoperation mit nachfolgendem plastischen
Ersatz des Defektes in zwei Zeiten.**

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrath Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Ferdinand Brüny

prakt. Arzt aus Bremen.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meiner Mutter.



Vorliegender Fall einer Krebsoperation in zwei Zeiten ist bis jetzt der einzige, welcher zuerst von Herrn Geheimrath von Nufsbaum ausgeführt worden ist. Bevor ich auf denselben näher eingehe, sei es mir gestattet, einige Worte über Operationen en deux temps zu sagen. Der Gedanke, eine gefährliche Operation durch eine Operation en deux temps ungefährlich zu machen, ist keine Errungenschaft der neuesten Zeit; denn B. von Langenbeck hat dieselbe im Jahre 1854 angegeben und zwar für die subcutane Osteotomie. Der Beweggrund, welcher den berühmten Chirurgen veranlafte, eine neue, von den bisherigen Methoden wesentlich abweichende zu empfehlen und selbst zuerst zur Ausführung zu bringen, war die Gefahr der septischen Infection, welche man in jener Zeit, also lange vor der so unendlich segensreichen Erfindung und Einführung der Lister'schen Antiseptik, mit vollem Rechte bei complicirten Fracturen fürchtete. Und was anders war und ist bis zum heutigen Tage die Osteotomie, ausgeführt nach der alten Methode, nach welcher die Durchbohrung oder Durchmeißlung mit nachfolgender Abknickung der noch bestehenden dünnen Knochenlampe geschah, als eine complicirte Fractur! Da, wie gesagt, zu jener Zeit von einer Antiseptik, wie sie jetzt von allen Chirurgen geübt wird, keine Rede war, so suchte von Langenbeck der Gefahr einer eitrigen Ostitis, welche sich nach Osteotomien so häufig einzustellen pflegte, vorzubeugen, indem er die bisherige Operationsmethode dahin modificirte, dafs er die complicirte Fractur vermied. Während

bisher in den Fällen, in welchen wegen Stärke der Knochen, wegen der Nachbarchaft wichtiger Gefäße und Nerven u. f. w. eine gewaltsame Fractur durch äußere Gewalt nicht zu erzielen war, die Osteotomie derart ausgeführt wurde, daß nach Durchtrennung der Weichtheile bis auf den Knochen letzterer angebohrt und theilweise durchsägt oder angemeißelt und dann die künstliche Fractur hergestellt wurde, führte von Langenbeck ¹⁾ die subcutane Osteotomie en deux temps bei zwei Kranken im Jahre 1854 aus und zwar an der Tibia. In derselben Art wie früher führte er einen zolllangen Schnitt, welcher die Weichtheile durchtrennte, und durchbohrte alsdann mit einem Bohrer die ganze Dicke des Knochens. In dieses Bohrloch führte er eine feine Stichsäge und sägte nun den Knochen bis auf eine dünne Corticalschicht durch. Darauf Vereinigung der Hautwunde durch die Naht. Seine Hoffnung, es werde die Haut- und Refectionswunde ohne Eiterung in wenigen Tagen heilen, ging jedoch nicht in Erfüllung. Bei beiden Patienten trat eine ziemlich starke Eiterung auf, welche bei einem der Kranken 14 Tage lang andauerte. Nachdem die durch die Osteotomie angeregte Entzündung und Eiterung abgelaufen war, nahm er den zweiten Akt der Operation vor, die Durchbrechung der dünnen Corticalschicht durch äußere Gewalt und erzielte so eine einfache, nicht complicirte Fractur. Der weitere Verlauf bei beiden Patienten war ein vollkommen befriedigender. Jedoch nicht befriedigt durch den Anfangs ungünstigen Verlauf in beiden Fällen, gab von Langenbeck diese Methode en deux temps wieder auf und operirte jetzt einen anderen Fall derart, daß er Osteotomie und Knochenbruch unmittelbar auf einander folgen ließ und zwar mit günstigem Erfolge.

Heut zu Tage, wo Dank der Einführung und auch so vollkommenen Anwendung der Antiseptik die Gefahr einer

¹⁾ Deutsche Klinik, Jahrgang 1854, Nr. 30.

Infektion bei complicirten Fracturen, wenn auch nicht ganz beseitigt, so doch auf ein Minimum reducirt erscheint, findet die von Langenbeck'sche Methode der subcutanen Osteotomie en deux temps keine Anwendung mehr, da man durch die Osteotomie mit gleich nachfolgender Fracturirung des Knochens dem Patienten die Dauer des Krankenlagers bedeutend abkürzt.

G. Simon hat zuerst ein Verfahren angegeben bei der Operation von Echinococcusgeschwülsten der Unterleibshöhle, durch welches er dieselbe in zwei Zeiten ausführte. Da in der damaligen Zeit eine operative Entfernung eines Echinococcus aus der Bauchhöhle wegen der Gefahr einer Peritonitis nicht wohl ausführbar war, so führte G. Simon die Operation in folgender Weise aus: Er stach zwei feine Troicarts in einer Entfernung von circa 2—3 cm von einander in die Geschwulst ein und verschloß, um eine Entleerung und eine hiedurch bedingte Entfernung der Geschwulst von der vorderen Bauchwand zu verhindern, die äußeren Oeffnungen der Canülen mit Wachs. Beide Canülen übten als Fremdkörper einen Reiz aus, und es entstand so zwischen beiden eine adhaesive Peritonitis, welche das parietale Blatt des Peritoneums mit dem visceralen Blatte deselben verschmolz. Auf diese Weise fand aber auch zugleich eine Verwachsung des Echinococcusackes mit der Bauchwand statt, und Simon konnte nun nach einigen Tagen eine Incision zwischen den beiden Canülen bis in den Echinococcusack machen, ohne die Bauchhöhle zu eröffnen und zu gefährden. Dieselbe Methode der Entfernung eines Echinococcus der Bauchhöhle kann auch noch heutzutage ausgeführt werden, jedoch muß man bedenken, daß, wenn man unter den Mafsregeln der Asepsis operirt, eine adhaesive Peritonitis, wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht zu Stande kommt.

Wiederum war es die Furcht vor Sepsis, welche Langenbuch ¹⁾ veranlafste, eine neue Methode der Sectio alta en

¹⁾ Archiv für klin. Chirurgie Band XXVI. Heft 1.

deux temps anzugeben. Da bei der Sectia alta eine Verletzung des Peritoneums äusserst leicht vorkommen kann, zumal da die Umschlagsstelle desselben auf die Bauchwand ziemlich weit herabreichen kann, so schlug Langenbuch ein Operationsverfahren vor, durch welches, selbst wenn es sich um eine grössere Eröffnung der vorderen Blasenwand handelt, also bei Entfernung von grossen Steinen, eine Eröffnung der Bauchhöhle nicht stattfinden soll. Die Operationsmethode, welche er, wie er in seiner Veröffentlichung erwähnt, nur an der Leiche ausführte, ist folgende: 4—5 cm langer Querschnitt am oberen Rand der Symphyse und an den Endpunkten desselben ein circa 3 cm langer sagittaler Schnitt, durch welche die vordere Blasenwand sowie die paravesicale Bauchfalte freigelegt wird. Die Blutung soll bei dieser Schnittführung eine sehr geringe sein, da von den Gefässen höchstens der Ramus pubicus der Art. epigastrica inf. getroffen werden kann, welche leicht zu unterbinden ist. Nach Freilegung der paravesicalen Bauchfalte wird dieselbe angeschnitten und auf der Hohlsonde, entsprechend der Länge des primären Hautschnittes gespalten. Hierauf rollt man den Bauchwandlappen etwas nach Innen und zwingt ihn hinter den Scheitelpunkt der Blase zurück, woselbst er entweder durch einige Nähte oder durch Einlage von Gaze in der gewünschten Lage erhalten werden kann. Nach Anlegung des antiseptischen Verbandes wird sich nun nach 5—8 Tagen ein neuer Bauchfellverschluss herstellen können, welcher nur einige Centimeter nach oben verschoben ist. Ist derselbe vollkommen eingetreten, so kann zur Eröffnung der Blase und Extraction des Steines geschritten werden. Nach Entfernung des Steines wird ein Nélaton'scher Katheder vom Innern der Blase aus durch die Urethra geführt und hierauf die Wunde sorgfältig durch Nähte geschlossen. Durch ein in die Blase hineinreichendes Drainrohr kann selbige nach Bedürfniss mit antiseptischen Flüssigkeiten ausgespült werden. Da zugleich der Urin durch den Katheter freien Abfluss hat,

so wird auf diese Weise jede verderbliche Urineinwirkung von der Blafennaht abgehalten. Die Vortheile, welche Langenbuch durch dieses Operationsverfahren *en deux temps* zu erzielen glaubt, sind Vermeidung profuser Blutungen, septischer Harninfiltration und einer tödtlichen Peritonealverletzung. Wie bereits erwähnt, hat Langenbuch bis jetzt diese Operation nur an der Leiche ausgeführt. In wie weit selbige den gewünschten Erwartungen entsprechen wird, muß erst der Erfolg am Lebenden ergeben.

Außer diesen von B. von Langenbeck, G. Simon und Langenbuch angegebenen Operationen *en deux temps*, durch welche vor Allem angestrebt wurde, eine septische Infection mit nachfolgender Pyaemie zu vermeiden, müssen wir noch einige weiteren Operationen, ausgeführt in zwei, resp. mehreren Sitzungen, anführen, durch welche man nicht so sehr jenes Resultat zu erreichen suchte, als vielmehr eine Erleichterung der ganzen Operation.

Hierher gehört die Zurücklagerung des prominenten Zwischenkiefers bei doppelseitiger Hafenscharte, welche zuerst im Jahre 1868 gleichzeitig von Bardeleben, A. Guérin, Delore und Mirault in zwei Zeiten angegeben wurde. Während bei den bis dahin angewandten Methoden der Erfolg der Zurücklagerung des prominenten Zwischenkiefers in zweierlei Hinsicht oft zu wünschen übrig liefs, nämlich einmal durch die Blutung aus den beiden durchschnittenen A. A. septi narium und zweitens durch das Ausbleiben einer festen Verbindung des Zwischenkiefers mit dem hinteren Theil des Vomer, wurden durch die in dem betreffenden Jahre ausgeführte subperiostale Excision eines dreieckigen Stückes aus dem Vomer jene Nachtheile gänzlich beseitigt.

Was das Operationsverfahren anbelangte, so wurde folgendermassen vorgegangen: Zunächst führt man einen Längsschnitt, welcher Schleimhaut und Periost durchtreimt. Derselbe muß genau auf den freien Rand des Vomer fallen und ver-

läuft dann zwischen den beiden A. A. septi narium. Darauf werden die Weichtheile mit dem Perioft von Vomer mit einem Elevatorium abgehelt und mit einer starken Scheere ein dreieckiges Stück aus dem Vomer excidirt. Jetzt drängt man den Zwischenkiefer in die normale Stellung zurück und fixirt ihn mit quer übergelegten Heftpflasterstreifen einige Tage hindurch, bis seine Einheilung erfolgt ist. Ist diese eingetreten, so schreitet man zum zweiten Akt der Operation, zum Schluss der Lippenpalte, welche nach der bekannten Methode erfolgt. Die Combination beider Operationen kann jedoch auch in einer Sitzung ausgeführt werden und wird auch heutzutage von den meisten Chirurgen vorgezogen, weil durch sie eine weit sichere Feststellung für den Zwischenkiefer erzielt wird als durch die Heftpflasterstreifen.

Durch die von Middeldorpf eingeführte Galvanocautik ist eine weitere Operationsmethode in mehreren Zeiten gegeben bei der Behandlung cavernöser Tumoren. Die oft sehr weite Ausdehnung derselben, ihr Zusammenhang mit tiefer liegenden Gebilden und ihr Vorkommen als angeborene Geschwülste, deren jähes Wachsthum oft ein operatives Einschreiten bei noch sehr kleinen Kindern nothwendig macht, lassen in einer Reihe von Fällen die Exstirpation mit dem Messer nicht immer rathsam erscheinen. Von eminentem Werthe ist in solchen Fällen die Galvanocautik. Wir finden dieselbe theils allein zur Ausrottung der Angiome gebraucht, theils zu vorbereitenden Operationen verwendet, um die Gewebe so zu verändern, dass sie sich für die nachfolgende Exstirpation mit dem Messer eignen. Die Art und Weise der Anwendung der Galvanocautik bei cavernösen Tumoren ist folgende: Je nach der Grösse der Geschwulst werden ein oder mehrere Platindrähte durch dieselbe mit einer Nadel durchgeführt, und lässt man alsdann durch aufgesetzte Klemmen den Draht nach der beabsichtigten Wirkung mehr oder weniger lang erglühen, wodurch einmal die Blutung sehr unbedeutend wird und anderer-

seits zugleich die Gewebe zur Verödung gebracht werden. Eventuell muß natürlich bei größerer Ausdehnung der Geschwulste dieses Verfahren öfters wiederholt werden. In gleicher Weise kann man auch das zuerst von Herrn Geheimrath von Nufsbaum ¹⁾ angegebene nagelförmige Glühcisen gebrauchen, welches an einer oder mehreren Stellen, ebenfalls eventuell in mehreren Sitzungen, in die Geschwulst eingefenkt wird. Ferner verwendet man Galvanocauterien verschiedener Art dazu, um die Geschwulst von der Oberfläche her zu zerstören und zwar in mehreren Zeiten, um die Reaction abzuwarten oder nicht zu stark werden zu lassen.

Ein großer Fortschritt in der Behandlung der Ectopia vesicae wurde von Thiersch im Jahre 1869 durch die Methode der Ueberpflanzung granulirender Lappen in mehreren Sitzungen in die Chirurgie eingeführt. Während nämlich bis dahin der Uebelstand des plastischen Verschlusses der Bauchblasenspalte in einer Sitzung sich darin zeigte, daß der transplantierte Lappen sehr häufig gangraenös wurde, so schlug Thiersch ein Verfahren ein, durch welches zwar der Verlauf bis zum definitiven Verschluss des Defectes ein bedeutend protrahirter wurde, dafür aber mit Sicherheit ein Gangraenöswerden der Lappen vermieden wurde. Zur Deckung des Defectes brauchte Thiersch zwei seitliche Lappen aus der Bauchhaut, deren jeden er so groß vorzeichnete, als ob er allein den Defect schließen sollte. Der erste Lappen muß den unteren Theil des Defectes decken. Man hält sich bei der Umschneidung desselben mit dem inneren Schnitt möglichst median an Blasenrand und Peniswurzel; der äußere Schnitt wird dem ersteren parallel bis unter das Ligamentum Poupartii geführt. Das so umschriebene, oben und unten nicht getrennte Hautstück wird nun in situ brückenförmig gelöst und ein Staniolplättchen untergeschoben. Granulirt die Hautbrücke auf ihrer unteren Seite kräftig, so

¹⁾ Bayr. ärztl. Intelligenzblatt 1861.

verbindet man die oberen Enden der Seitenschnitte und hat nun einen granulirenden, stark vascularisirten Lappen mit der Basis unten, der über den unteren Theil des Defectes gelegt und mit den Blasenrändern genau vereinigt wird. Ist die Anheilung erfolgt, so schließt man in analoger Weise den oberen Theil, nur wird der Decklappen aus einem etwas höher gelegenen Stück der Bauchhaut gebildet.

Eine Hauptschwierigkeit bei der Operation der Blasen-scheidenfisteln, zumal wenn dieselben hoch oben sitzen, ist das ungünstige Operationsterrain. Diesem Uebelstande suchte Baker Brown durch folgendes Verfahren abzuhelpen. Ungefähr vierzehn Tage zuvor er den Verschluss der Fistel ausführt, macht er je eine rechts- und linksseitige Incision in die Schleimhaut, welche sich durch die ganze Vagina bis zum Introitus erstrecken, und füllt alsdann die Scheide mit Charpie aus. Diese Schnitte contrahiren sich nun narbig, und die Folge davon ist, dass die Fistel tiefer nach unten gezogen wird. Auf diese Weise erhielt Baker Brown ein bei weitem bequemer Operationsfeld, und es gelang ihm so, die Schließung der Fistel, welche sonst oft einen mehrstündigen Zeitaufwand erforderte, in circa 15 Minuten auszuführen.

Bei krampfartiger Kieferklemme, wie man sie oft auftreten sieht nach Scharlach, Masern und lang fortgesetztem Calomelgebrauch, hatte man früher die subcutane Myo- und Tenotomie der Kaumuskeln ausgeführt, jedoch meist ohne Erfolg, da mit der Heilung die Wirkung der Tenotomie verschwand. Es ist das Verdienst von B. von Langenbeck, eine Methode en deux temps zuerst empfohlen und ausgeführt zu haben, durch welche es ihm gelang bei krampfartiger Kieferklemme eine absolute Heilung zu erzielen. In der ersten Sitzung durchtrennt von Langenbeck die äußere Haut und den M. masseter vollständig. Hierauf lässt er 14 Tage lang

¹⁾ Lancet. March. 1864.

täglich ausgiebige Kaubewegungen anstellen, frischt dann die Hautränder an und vereinigt sie wieder durch die Naht, nicht jedoch den M. masseter. Das Resultat war stets ein gutes.

Eine weitere Operation in zwei Sitzungen ist die von v. Bruns angegebene Methode der Anlegung der Naht nach Amputationen erst nach Verlauf von 2—3 Stunden. v. Bruns glaubte durch längeres Offenlassen der Weichtheile und dadurch bedingtes reichlicheres Ausbluten ein *prima reunio* eher zu erzielen, als wenn er unmittelbar nach der Amputation die Wundränder vereinige. Heutzutage, wo stets unter antiseptischen Cautelen operirt wird, dürfte wohl jene Methode nicht mehr in Anwendung gebracht werden.

Als letzten Fall einer Operation *en deux temps* möchte ich noch die Transplantation eines Knochenstückes anführen, welche vor 10 Jahren von Herrn Geheimrath von Nufsbaum zum ersten Male mit Erfolg ausgeführt worden ist und bis jetzt der einzig dastehende Fall ist. Es fand sich bei dem betreffenden Kranken ein ziemlich bedeutender Defect der Ulna. Nachdem zuvor von vier Chirurgen verschiedene operative Eingriffe vorgenommen waren, als Einschrauben von goldenen Schrauben u. s. w., um eine Wucherung des Knochens zu erzielen, jedoch ohne jeglichen Erfolg, machte Herr Geheimrath von Nufsbaum folgende Operation: Er trennte von der Ulna subperioftal ein Stück entsprechend der Grösse des Defectes ab, so dafs es am Perioft hängen blieb, und lagerte dann das Knochenstück herüber. Die Heilung gelang vollkommen. Dafs es Herrn Geheimrath von Nufsbaum gelungen ist das Knochenstück zur Anheilung zu bringen, kann man, wie er selbst sagt, nur darauf zurückführen, dafs das Perioft in Folge der verschiedenen vorausgegangenen Eingriffe stark hypertrophisch und vaskularisirt war, und somit das Knochenstück reichlich ernährt wurde. Soll die Transplantation von Knochenstücken überhaupt gelingen, so mufs sie stets *en deux temps* gemacht werden. Man mufs nämlich zuerst durch Reizung des Perioftes

daselbe stark hypertrophisch machen, und wenn dieses eingetreten in einer zweiten Sitzung das Knochenstück subperiostal abtrennen und transplantiren.

In neuester Zeit hat nun Herr Geheimrath von Nufsbaum eine Krebsoperation im Gesicht mit nachfolgender Transplantation zur Deckung des entstandenen Defektes ebenfalls en deux temps ausgeführt, aber aus einem anderen als den bisherig angeführten Motive. Nicht die Beforgniß einer Infection bei der Entfernung des Carcinoms ließen ihn die Operation in zwei Zeiten vollziehen, sondern einzig und allein der Umstand, daß der Kranke sehr herabgekommen und decrepide war, und somit zu befürchten stand, daß derselbe beide Eingriffe, die Entfernung der Geschwulst und die Labioplastik, in einer Sitzung ausgeführt, nicht überleben werde. In wie weit diese Krebsoperation en deux temps ihre vollberechtigte Geltung hat, werden wir aus dem Krankheitsverlaufe weiter unten erfahren.

Johann Ecker, 63 Jahre alt, Waldauffeher aus Irnkofen.

Anamnese:

Hereditäre Krankheiten sind in der Familie des Patienten nicht nachweisbar. Sein Vater starb im Alter von 54 Jahren, an welcher Krankheit weiß Patient nicht anzugeben, doch soll er starker Potator gewesen sein. Die Mutter starb im 70. Lebensjahre an allgemeiner Wässerfucht. Eine Schwester, welche verheirathet ist, erfreut sich der besten Gesundheit.

Patient selbst will in seiner Jugend nur die gewöhnlichen Kinderkrankheiten als Scharlach, Masern und Varicellen überstanden haben. In seinem späteren Alter will er stets gesund gewesen sein, mit Ausnahme einer Erkrankung in seinem 20. Lebensjahre am „Gallenfieber“ und am Typhus in seinem 50. Lebensjahre. Patient ist verheirathet und Vater von zwei Kindern, welche gesund und munter sein sollen. Was sein jetziges Leiden anbetrifft, so giebt er über die Entstehung desselben folgendes an: Vor fünf Jahren habe er ohne jegliche

nachweisbare Urfache ein Geschwürchen an die linke Hälfte der Unterlippe bekommen und zwar an der Grenze zwischen dem Lippenfaum und der äusseren Haut, welches ungefähr die Grösse eines Ein-Pfennigstückes hatte. Dasselbe soll schuppenartig ausgesehen haben, von weicher Consistenz gewesen sein und bis Anfangs dieses Jahres nicht geschmerzt haben. Aus demselben soll häufig eine weissliche Flüssigkeit herausgekommen sein. Während im Verlaufe der Winter das Geschwür stets völlig zum Verschwinden kam, nahm es nach Wiederaufbruch im Frühjahr allmählig in sehr geringem Maasse an Grösse zu, so dass es im April dieses Jahres erst den Umfang eines Zehnpfennig-Stückes erreicht hatte. Im letzten Winter soll das Geschwür nicht zur Verheilung gelangt sein. Seit $1\frac{1}{2}$ Jahren soll dasselbe fernerhin sehr zu Blutungen geneigt gewesen sein, welche sich jedoch nicht spontan, sondern nur auf einen äusseren Insult hin einzustellen pflegten. Dieser Insult brauchte die erkrankte Partie nicht direct zu treffen, es genügte schon eine Erschütterung der benachbarten Gegend. So giebt Patient an, dass er in Folge seines Berufes als Waldauffeher öfters habe schießen müssen, und es jedesmal durch die Erschütterung zur Blutung gekommen sei. Während bis April dieses Jahres das Geschwür nur sehr wenig an Umfang zunahm, soll von dieser Zeit ab dasselbe in rapider Weise um sich gegriffen haben und sollen sich zugleich, wie bereits oben erwähnt, äusserst heftige Schmerzen eingestellt haben. Es ergriff die ganze Unterlippe und das Kinn, ging von hieraus auf den linken Mundwinkel und auf die linke Hälfte der Oberlippe über.

Bereits vor vier Jahren suchte Patient Rath und Hülfe bei einem Arzte. Derselbe verordnete Pudern des Geschwürs mit Alaun. Diese Behandlungsweise setzte Patient $\frac{1}{2}$ Jahr lang fort, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Ein anderer Arzt, an den sich der Kranke jetzt wandte, gab ihm den Rath, das Geschwür exstirpiren zu lassen, wozu Patient sich sofort bereit erklärte. Da aber in seinem damaligen Aufenthaltsorte kein

Spital war, so scheute Patient die Kosten einer Privatbehandlung und es blieb beim Alten. Da jedoch das Geschwür allmählig an Umfang zunahm, so consultirte Patient einen weiteren Arzt. Derselbe erklärte das Leiden für unbedeutend und verordnete nasse Compressen, welche einmal am Tage erneuert werden sollten. Dieses Verfahren setzte Patient 3 Wochen hindurch fort; das Resultat war, daß die Gegend um das Geschwür herum ziemlich bedeutend anschwell, welche Geschwulst jedoch bald nach Weglassung der Compressen spontan zurückging. Patient, unzufrieden mit den bisherigen Erfolgen resp. Misserfolgen der Behandlung, war wenig besorgt um sein Leiden und entzog sich der ärztlichen Behandlung. Erst im April dieses Jahres, als das Geschwür rasch anfang sich zu vergrößern, wandte er sich wieder an einen Arzt, welcher ihm den Rath gab, sich in die hiesige chirurgische Klinik aufnehmen zu lassen, wofelbst denn auch am 5. Mai seine Aufnahme erfolgte. Eine Infection quo ad genitalia stellt Patient entschieden in Abrede. Während seiner ganzen Krankheit bis zum April dieses Jahres will er sich stets wohl befunden haben und noch bis vor $1\frac{1}{2}$ Jahre seinen Beruf als Waldauffeher nachgekommen sein, von dieser Zeit ab nicht mehr, da durch die Erschütterungen beim Schiessen die Blutungen leichter eintraten und auch profuser wurden. Auch will der Kranke seit April abgemagert sein, was leicht erklärlich, da er ja durch sein Leiden an der Nahrungsaufnahme sehr behindert war. Was das Allgemeinbefinden des Patienten anbetrifft, so ist dasselbe trotz seines schweren Leidens im Ganzen und Großen zufriedenstellend. Schlaf, Appetit und Verdauung sind gut. Temperatursteigerungen sind nicht zu verzeichnen.

Status praesens:

Patient, ein 63jähriger Mann, jedoch bedeutend älter aussehend, ist von großer Statur. Die Muskulatur, sowie der Panniculus adiposus sind schlecht entwickelt, wie denn überhaupt

der Kranke stark abgemagert ist. Der Knochenbau, ziemlich robust, zeigt keine Spuren überstandener Rachitis. An den sichtbaren Schleimhäuten ist eine geringe Anämie wahrnehmbar. Durch die Percussion und Auskultation ist über den Lungen und am Herzen Nichts Abnormes nachzuweisen. Der Urin ist frei von Eiweiß. Das Gesicht des Patienten bietet einen schrecklichen Anblick dar. Die Unterlippe bis zum Kinne fehlt; an ihrer Stelle findet sich eine Geschwürsfläche, welche sich, auf den linken Mundwinkel und von da auf die Oberlippe fortpflanzend, auch hier zerstörend eingewirkt hat. Der Rand des gefamnten Geschwüres, welches stinkenden Eiter in reichlicher Menge absondert, ist ausgefreffen, gewulstet, geröthet und stark indurirt. Die Geschwürsfläche liegt tiefer bis zu $\frac{1}{2}$ Ctm. als die benachbarte gesunde Umgebung; sie ist unregelmäßig, zeigt kleine warzenförmige, bei der leisesten Berührung leicht zur Blutung geneigte Höcker, zwischen diesen von Sekret und Schmutz erfüllte Kluften. An einigen Stellen finden sich Krusten, bestehend aus eingedicktem eitrigem Sekret, Blut und Schmutz. Unten sitzt das Geschwür, besonders am Kinn, fest auf dem Knochen auf, so daß dieser, jedenfalls aber sicher sein Periost schon in Mitleidenschaft gezogen ist. An der Grenze der Schleimhaut der Unterlippe und der Gingiva der unteren Schneidezähne hat das Geschwür auf die Gingiva übergegriffen. Wie bereits oben erwähnt ist der linke Mundwinkel sowie die linke Hälfte der Oberlippe ebenfalls von dem Geschwür zerstört, und beträgt die Breite der Zerstörung an der letzteren vom Lippenfaume ab gerechnet circa $\frac{1}{2}$ — 1 Ctm. Eine Induration benachbarter Lymphdrüsen besteht jedoch nachweisbar nicht.

Diagnose:

Der Sitz und das Aussehen des Geschwüres unter Berücksichtigung des Alters des Individuums zwingen die Diagnose zu differenziren zwischen Syphilom, Lupus und Carcinom. Um

zu entscheiden, mit welcher von diesen Erkrankungen der Haut wir es hier zu thun haben, müssen wir einerseits die Anamnese berücksichtigen, andererseits aber auch mit wenigen Worten das Entstehen und das klinische Bild eines jeden der genannten Geschwürsprozesse schildern.

Die erste Möglichkeit, daß es sich bei unserem Patienten um ein Syphilom handeln könnte, dürfen wir schon mit ziemlicher Bestimmtheit von vornherein ausschließen; denn der Kranke stellt jede syphilitische Infection in früheren Jahren entschieden in Abrede, was zu glauben wir auch berechtigt find, da sich weder an den Genitalien noch an einer sonstigen Stelle des Körpers ältere oder jüngere Symptome der Syphilis finden. Andererseits aber entspricht das Aussehen des ursprünglichen kleinen Geschwüres an der Unterlippe durchaus nicht dem Bilde, welches uns das Syphilom zeigt. Vor Allem aber find es zwei Faktoren, welche die Annahme, daß es sich um ein Syphilom handle, nicht gestatten. Zunächst der Umstand, daß bei dem Kranken das Geschwür auf den leifesten Insult hin zu Blutungen geneigt war, welche beim Syphilom in Folge seines an Gefäßen armen Bindegewebes nicht auftreten, und zweitens die langsame, aber stetige Entwicklung des Geschwüres. Ein Geschwür, welches Jahrelang besteht, scheinbar (vielleicht mit Borken?) heilt, dann wieder erscheint, dann sich plötzlich vergrößert, ist kein syphilitisches. Ein Syphilom bietet neben Zerfall an der einen Stelle auch Neubildung an einer anderen, das Carcinom dagegen schreitet zerstörend nach allen Richtungen weiter.

Fernerhin könnten wir annehmen, daß es sich bei unserem Patienten um Lupus handle. Gegen Lupus spricht jedoch folgendes:

Zunächst das Alter des Kranken. Es entwickelt sich bekanntlich der Lupus in der Regel bei jugendlichen Individuen, ungefähr vom 8. Lebensjahre an bis hinein in die Jahre der Pubertät, während man jenseits der vierziger Jahre ziemlich

gesichert ist gegen diese Krankheit. Auch ist der erste Entstehungsort sehr selten an der Lippe, sondern bei Weitem in der Mehrzahl der Fälle an der Nasenspitze und von dort aus fortschreitend auf die Nasenflügel, Oberlippe und Wangen. Während man ferner in den meisten Fällen von Lupus nicht einen einzelnen Erkrankungsheerd findet, sondern dieselben meist infelförmig vertheilt sind, zeigte sich bei unserem Kranken nur an der einen betreffenden Stelle ein Geschwürchen. Hätte es sich in unserem Falle um Lupus gehandelt, so müßten wohl bei dem langjährigen Bestehen der Erkrankung auch die Zerstörungen größer und mehr in die Tiefe gehend sein, als es bei dem Kranken der Fall ist.

Haben wir gesehen, daß es sich weder um eine syphilitische noch lupöse Erkrankung bei unserem Patienten handelt, so bleibt uns jetzt noch übrig, den Beweis zu führen, daß die Geschwürsbildung ein Carcinom ist. Die Anamnese gibt uns für die Stellung der sicheren Diagnose schon zum Theil die Mittel an die Hand, vollständig der Status praesens. Schon der Anblick der Geschwürsfläche macht den Eindruck, als handle es sich um ein rasch um sich greifendes Carcinom. Der unregelmäßig aufgefressene Rand des Geschwüres, welcher, stark infiltrirt, sich wallartig über die Nachbarschaft erhebt, die tiefer liegende, leicht blutende und stinkenden Eiter in reichlicher Menge absondernde Geschwürsfläche mit ihren warzenförmigen Höckern zeigt uns das ausgeprägte Bild des Carcinoms. Weiterhin spricht für die Annahme, daß es sich um ein Carcinom handle, das Alter des Patienten; denn das Lippencarcinom ist eine Krankheit des höheren Alters, es kommt meist in den 50–60iger Jahren vor. Auch der ganze Verlauf des anfangs kleinen Geschwüres, welches ohne an seiner ursprünglichen Stelle zur Verheilung zu gelangen — denn die Angabe des Patienten, daß das Geschwür im Winter verheilt sei, beruht wohl jedenfalls auf Irrthum, es werden sich eben nur Krusten gebildet haben, welche dem Kranken das

Bild der Geschwürsfläche entzogen und so die Meinung einer Heilung hervorriefen — weiter und weiter um sich griff, läßt es zur Gewissheit werden, daß es sich in der That um ein Carcinom handelt.

Es fragt sich nunmehr, mit welcher Art des Carcinoms haben wir es in unserem Falle zu thun. Der Hautkrebs, welcher im Gesichte auftritt, ist der Epithelkrebs, für welchen Thiersch¹⁾ zwei Formen unterschieden hat, nämlich die des flachen und des tiefgreifenden Epithelkrebses. Beide bieten durch Aussehen, Verlauf, Prognose und Lokalisation ein verschiedenes klinisches Bild dar und sind auch weiterhin durch ihre histologischen Elemente leicht von einander zu trennen. Haben wir zwar nach Thiersch zwei Arten des Epithelkrebses zu unterscheiden, so dürfen wir doch nicht außer Acht lassen, daß Uebergänge zwischen beiden Formen ziemlich häufig zur Beobachtung gekommen sind und zwar der Art, daß oft nach jahrelangem Bestehen sich aus dem prognostisch weit günstigeren flachen Epithelkrebs ein tiefgreifender herausgebildet hat. So ist es auch ohne Zweifel bei unserem Patienten der Fall gewesen. Während es sich anfänglich um ein flaches Epithelcarcinom, ein Ulcus rodens, handelte, welches über vier Jahre hindurch fast stationär blieb, hat sich erst nach dieser Zeit aus demselben ein tiefgreifender Epithelkrebs mit seiner kraterförmigen, rasch um sich greifenden Ulceration entwickelt. Wir stellen daher die Diagnose auf »Carcinoma labii inferioris, anguli oris sin., labii superioris, mentis.«

Aetiologie:

Wie man überhaupt spezielle Gelegenheitsursachen, welche den Anlaß zur Carcinomentwicklung der Unterlippe geben, in der Mehrzahl der Fälle nachzuweisen nicht im Stande ist, als Druck der Lippe durch das Pfeifenmundstück, Einwirkung des Pfeifenaftes u. f. w. — eine Ansicht, welcher z. B.

*) Thiersch, der Epithelkrebs namentlich der Haut. Leipzig 1865.

Thierfch nicht beipflichtet — fo können wir auch in unfere Falle ein ätiologifches Moment nicht anführen, da Patient nach feiner Angabe kein Raucher ift, noch fonft irgend welche lang auf die fragliche Stelle einwirkende Infulte erlitten haben will. Auch zu einer erblichen Disposition ift uns kein Anhalt geboten, da die Anamnese in diefer Hinficht Nichts Positives ergibt. Es bleibt uns demnach nur übrig der Anficht von Thierfch beizupflichten. Nach derfelben follten im Lippen- gewebe Veränderungen vorgehen, welche bedingt find durch die im Alter fich einftellende allgemeine Herabfetzung vitaler Energie, wodurch der Schwund des Bindegewebes in hohem Grade begünstigt wird. Und gerade diefer Schwund des Bindegewebes bietet einen fruchtbaren Boden dar zur Verbreitung für die Epithel-Wucherung zumal an diefer Haut- fteile, an welcher das Epithel fchon von Haufe aus in hyper- plaftifcher Form vorhanden war.

Prognose:

Was die Prognose anbetrifft, fo find wir auf keine Weife berechtigt, diefelbe als eine günstige hinzustellen, im Gegen- theil, wir müßten diefelbe vor der Hand als dubia bezeichnen. Wenn auch bei der auszuführenden Operation möglichft weit im Gefunden operirt und fo dem Anfcheine nach Alles Krank- hafte entfernt werden wird, fo können wir doch nicht mit Bestimmtheit vorausfagen, ob die Heilung eine vollkommene fein und nicht nach kürzerer oder längerer Zeit ein Recidiv fich wieder einftellen wird. Ein Umftand freilich bei unfere Kranken könnte uns die Vermuthung nahe legen, dafs nach gründlicher Entfernung des Carcinoms keine neue Eruption in Zukunft auftreten werde, nämlich der Umftand, dafs wir auch bei der genaueften Unterfuchung keine Infiltration weder der Submaxillar- noch der Occipitaldrüfen konftatiren können. Aber auch diefer, dem Anfcheine nach prognostifch günstige Befund kann und darf uns nicht veranlassen unfere Urtheil in

Bezug auf die Prognose zu ändern. Denn wenn wir auch eine Erkrankung der benachbarten Lymphdrüsen nachzuweisen nicht im Stande sind, so kann dieselbe trotzdem bestehen, jedoch eine bis jetzt so geringfügige sein, daß sie der äußeren Untersuchung entgeht. Es sind in der Literatur Fälle solcher Art in reichlicher Zahl vorhanden, in denen erst nach kürzerer oder längerer Zeit nach der Operation in den vor derselben dem Anscheine nach gefundenen Lymphdrüsen sekundäre Krebsknoten zufraten, ebenso bei anderen bösartigen Neubildungen, die mit sekundären Drüsenerkrankungen einhergehen, z. B. beim Sarkom. So wurde vor einem Jahre auf der von Nussbaum'schen Klinik wegen eines kolossalen Osteosarkoms am unteren Ende der Tibia die Unterschenkelamputation gemacht. Die Inguinaldrüsen waren damals nachweislich nicht erkrankt. Vor Kurzem kehrte der Patient mit einem über zwei faustgroßen Lymphosarkom der Inguinaldrüsen auf die Abtheilung zurück, welches dann extirpiert wurde. Jedenfalls prognostisch sehr unangenehm in unserem Falle quo ad Recidive ist das Mitergriffensein des Periostes und des Knochens des Unterkiefers im Bereiche des Kinnes. Die Prognose quo ad vitam ist äußerst schlecht. Die Erfahrung zeigt nämlich, daß nach solch ausgedehnten Krebsoperationen die Kranken, welche das 60. Lebensjahr überschritten hatten, meist nach einigen Tagen an Marasmus zu Grunde gingen. Anfangs freilich nach der Operation scheint eine Wendung zum Bessern eingetreten zu sein, indem der noch aufgespeicherte Parenchymsaft dem Kranken neue Kraft giebt. Der nicht unbedeutende Blutverlust bewirkt aber, daß kein neuer Saft mehr gebildet und aufgespeichert wird, und die Folge davon ist, daß bald der Tod durch Marasmus eintritt.

Therapie:

Es ist klar, daß der alte, sehr heruntergekommene Patient bei Fortbestand seines Leidens sehr bald zu Grunde gehen

wird. Denn einmal wird durch das Carcinom der Unterlippe oder besser ausgedrückt durch den Defect der ganzen Unterlippe die Nahrungsaufnahme sehr erschwert, ferner aber nimmt auch der Kranke von dem Sekret der jauchenden Geschwürsfläche beständig in seinen Körper auf, welche Thatfache schon sein kachektisches Aussehen bezeugt. Außerdem ist die Geschwürsfläche schon bei der geringsten Berührung zu Blutungen geneigt, und eine Arrosion eines größeren Gefäßes mit folgendem starken Blutverluste liegt sehr im Bereiche der Möglichkeit. Können wir dem Kranken auch eine radicale Heilung nicht mit Gewißheit versprechen, so sind wir doch gezwungen, operativ vorzugehen, einerseits um eine weitere Ausdehnung des Geschwüres mit seinen verderblichen Folgen zu verhindern, andererseits um dem Kranken das Leben, wenn auch im schlimmsten Falle nur auf Monate zu erleichtern und wieder angenehm zu machen.

Eine Hinwegnahme des Carcinoms ist also eine *Indicatio vitalis*. Es fragt sich nur auf welche Art und Weise die Entfernung der Geschwulst vorgenommen werden soll. Da, wie bereits oben erwähnt, der Kranke sehr decrepid und herabgekommen ist, so muß man vor Allem sein Augenmerk darauf richten, daß Patient bei der Operation möglichst wenig Blut verliert. Würde man die Hinwegnahme mit dem Messer vornehmen, so wäre ein ziemlich beträchtlicher Blutverlust nicht zu vermeiden. Ueberdies — wie bereits erwähnt — sind nach der Statistik des Herrn Geheimrath von Nufsbaum alle Individuen mit größeren Lippencarcinomen, die das 60. Lebensjahr überschritten hatten und die mit dem Messer operirt wurden, gestorben, hiervon die meisten wieder in der ersten Woche nach der Operation. Um nun der Gefahr eines Blutverlustes zu entgehen, wird eine Entfernung des Krankhaften mittelst glühender Instrumente geplant. Es hat sich nämlich nach neueren Versuchen gezeigt, daß einmal bei vorsichtigem, langsamem Operiren auf diese Weise kein oder ein nur äußerst

geringer Blutverlust stattfindet und zweitens, daß, wenn unter antiseptischen Cautelen operiert wurde, der Verlauf ein guter war und sich keine septischen Zerfallsprodukte unter dem Brandschorfe bilden. Letzteres werden wir jedoch bei unserem Falle nicht erreichen können. Denn eine Cauterisation unter antiseptischen Cautelen ist wegen der Communication der Operationsfläche mit der Mundhöhle, welche nicht zu beseitigen ist, nicht möglich. Daher kann man in unserem Falle nur auf den antiseptischen Verband vertrauen. Da wir nach Entfernung des Carcinoms einen kolossalen Defect bekommen werden, so wird die Deckung desselben schon aus kosmetischen Rücksichten beschlossen. Jedoch soll die Labioplastik nicht sofort an die Entfernung des Carcinoms angereicht werden, da einmal eine Ueberdeckung des entstehenden Brandschorfes mit einem Hautlappen nicht zweckmäßsig ist, andererseits aber vor Allem eine Vornahme beider Eingriffe in einer Sitzung den Kranken in die größte Lebensgefahr bringen würde.

Vorläufig wird nun der Kranke zur Operation vorbereitet; sein Backenbart wird entfernt, die leicht blutende Geschwürsfläche wird gereinigt und mit feuchtem Borlint darüber Guttaperchapapier verbunden. Patient wird mit kräftigen Brühen, Eiern, Bier u. s. w., welche Flüssigkeiten er mit dem Gummirohr einsaugt, ernährt.

9. V. Das Allgemeinbefinden des Patienten ist zufriedenstellend. Er war seither fieberfrei. Die Geschwürsfläche ist von den aufgelagerten Krusten möglichst gereinigt, und es wird heute die Entfernung des Carcinoms auf folgende Weise vorgenommen:

In tiefer Chloroformnarkose wird mit dem Thermokauter gut 1 Ctm. von der carcinomatösen Geschwürsgrenze entfernt die Haut und das Unterhautzellgewebe durchgebrannt. Diese Durchtrennung auf glühendem Wege wird sehr langsam vorgenommen, ohne zugleich den Thermokauter stark aufzudrücken, damit keine Blutung erfolge. Dennoch werden an Stellen,

wo die Operationslinie auf größere Gefäße stößt, diese von der Glühhitze nicht momentan thrombosirt, und es findet trotz aller Vorsicht ein geringer Blutverlust statt. Diesem, gerade für unseren Fall, unangenehmen Vorkommniß kann jedoch durch gleichzeitige Compression in der Umgebung der Brandlinie durch die Assistenten genügend vorgebeugt werden. Hierauf wird mit meißel- und schaufelförmigen Glühseisen die Neubildung von ihrer Basis langsam getrennt. Hierbei muß der Unterkieferknochen am Kinn in der Länge von 3 Ctm. (frontal) und in der Breite von 1 Ctm. (sagittal) von seinem Periost entblößt werden. Die Narkose und die so vorgenommene Wegnahme des Neoplasmas erfordert einen Zeitaufwand von $\frac{3}{4}$ Stunden. Nach vollendeter Operation wird die ganze Brandfläche mit feuchter Jodoformgaze, darüber Borlint und Guttaperchapapier verbunden.

Abends: Patient ist fieberfrei, Schmerzen traten nach der Operation nicht auf und sind auch jetzt nicht vorhanden. Ebenso blieb die Chloroformnarkose ohne üble Nachwirkung. Der Kranke hat etwas flüssige Nahrung durch die Gummiröhre eingenommen. Der hierdurch etwas beschmutzte Verband wird entfernt und ein neuer angelegt.

12. V. Mit dem Befinden des Patienten kann man bis jetzt in jeder Hinsicht zufrieden sein. Nach Entfernung des Verbandes zeigt sich, daß der Brandschorf schon an einigen Stellen sich demarkirt; zwischen ihm und der Haut wird ein rother Granulationsstreifen sichtbar. Die gebrannte Fläche secernirt ziemlich viel Eiter, der täglich mit Borwasser abgespült wird. Unter dem Schorfe findet sich an manchen Stellen ein eitriges Sekret, doch läßt sich dieses nicht gut entfernen, da man die Schorfe wegen einer eventuellen Blutung nicht wegnehmen kann. Temperatursteigerungen sind bis jetzt nicht zu verzeichnen.

16. V. Es ist keine wesentliche Veränderung in dem Zustande der Wundfläche eingetreten. Der Kranke befindet

sich den Umständen nach ganz wohl und ist völlig fieberfrei. Appetit, Verdauung, Schlaf gut.

17. V. Bei der heute Morgen vorgenommenen Temperaturmessung findet sich eine Temperatur von 39,0: Als Grund hierfür zeigt sich eine erysipelartige Röthe der die Brandfläche umgebenden Haut. Das Erysipel ist aller Wahrscheinlichkeit nach bedingt durch das unter dem Brandschorfe hie und da verhaltene eitrige Sekret, welches sich, zumal bei der Communication mit der Luft und auch durch die nicht zu verhindernde Berührung mit dem ablaufenden Speichel, der vom Verbande aufgesaugt wird, zersetzt hat. Im Uebrigen hat die Wundfläche keinen septischen, sondern nur einen Brandgeruch. Abendtemperatur 39,0.

18. V. Das Erysipel hat bis jetzt keine größeren Dimensionen angenommen. Morgen- und Abendtemperatur betragen 39,0.

19. V. Das Erysipel schreitet über das Gesicht weiter gegen die Augen zu, nach Unten auf den Hals. Temperatur Morgens 39,1. Abends 40,0.

21. V. Das Erysipel ist auf die Augenlider und auf die Stirn übergegangen. Die Lider, besonders das des rechten Auges, sind sehr stark geschwollen, so daß sie spontan nicht geöffnet werden können.

Temperatur Morgens 38,8. Abends 39,7.

22. V. Das Erysipel geht noch auf den behaarten Kopf über, setzt sich jedoch vom Halbe nicht auf den Rumpf fort. Der Verband wird täglich gewechselt; die Wundfläche fecerirt stark.

Temp. Morgens 39,2. Abends 39,5.

24. V. Bis heute ist keine Abnahme des Erysipels zu constatiren. Das Allgemeinbefinden des Kranken ist ziemlich zufriedenstellend.

Temp. Morgens 36,7. Abends 38,0.

25. V. Das Erysipel bläst ab und an den zuerst

ergriffenen Stellen beginnt bereits die Abschürfung der Epidermis. Auch der Brandshorf hat sich an allen Stellen bereits demarkirt und abgestoßen, und an seiner Stelle findet sich jetzt eine frische granulirende Fläche, die ziemlich reichlich secernirt.

Temperatur Morgens 36,0. Abends 37,8.

28. V. Der Kranke befindet sich seither ganz wohl und ist völlig fieberfrei. Die Abschürfung vom Erysipel ist fast vollendet. Im Anschluß an das Erysipel haben sich im oberen und unteren rechten Augenlid bohnengrößte, anfangs harte Anschwellungen gebildet, die jetzt erweicht sind und sich als Abscesse ergeben. Dieselben werden mit dem Messer eröffnet; es entleert sich guter, dicker Eiter. Feuchter Borlintverband. Der früher bestandene große Defekt hat sich durch üppige Granulationsbildung und durch hierdurch verursachtes Heranziehen der benachbarten Haut bedeutend verkleinert. Der am Kinn durch die Operation bloßgelegte Kieferknochen zeigt am Rande zwischen Granulationen der Nachbarschaft und Knochen eine deutliche Demarkationslinie und wird sich exfoliiren. Eine Entfernung dieses oberflächlichen Knochensequesters ist jedoch jetzt ohne Gewalt noch nicht möglich.

4. VI. Die Granulationsfläche ist rein und frisch aussehend. Der Knochensequester läßt sich noch nicht entfernen. Patient drängt sehr bald wieder nach Hause zu kommen und bittet, daß man die Labioplastik beeile. Da zu erwarten steht, daß die bereits vollständig demarkirte Knochenfläche mit geringer Gewalt mit dem Meißel abgehoben werden kann, so wird Patient, der sich sehr erholt hat, narkotisirt und alsdann zum zweiten Akt der Operation, zur Labioplastik geschritten. Nachdem zuvor der Knochensequester losgeholt ist, wird der Rand der Granulationsfläche angefrischt und aus der linken Wange ein den Defekt gut deckender Lappen herausgeschnitten. Während der Abpräparirung des Lappens findet eine ziemlich starke Blutung statt, welche jedoch bald durch Unterbindung der Art. et Vena transversa faciei gestillt

wird. Hierauf wird der Lappen mit Knopfnähten fixirt, und es ist nun der Defekt der Unterlippe wieder vollständig ersetzt. Die im ersten Akt der Operation exstirpirte Partie der Oberlippe in ihrer linken Hälfte hat sich durch Granulationsbildung ziemlich ersetzt, so dafs hier eine plastische Operation nicht vorgenommen zu werden braucht. Der auf der linken Wange durch Wegnahme des transplantierten Lappens entstandene Defekt wird durch Nähte, welche die Weichtheile, besonders in den Winkeln des Defektes, einander nähern, zu verkleinern gesucht. Der transplantierte Lappen hat eine Länge von 8,5 cm und eine Breite von 5 cm. Er hat eine rechtwinklige Gestalt, seine Basis oder der Stil des Lappens befindet sich 1 cm unterhalb einer von der Mundöffnung horizontal verlaufenden Linie, die Schnittlinie des Lappens verläuft vom linken Mundwinkel im Schatten der Nase in der Richtung des linken inneren Lidwinkels, geht horizontal unter dem linken Augenlid nach Aufsen circa 1 cm nach Aufsen vom äufseren Lidwinkel, von hier senkrecht nach abwärts.

4. VI. Abends misst Patient 40,3. Der Verband wird erneuert, der transplantierte Hautlappen, der schon sofort nach der Operation eine anaemische Farbe annahm, besonders an den durch die Naht in Anspruch genommenen Rändern, ist livid verfärbt und etwas oedematös. Eine der Entspannungs-nähte wird entfernt. Patient ist übrigens schmerzfrei.

5. VI. Patient fühlt sich recht wohl. Der Lappen hat seine livide Färbung theilweise verloren, nur ist der Rand desselben sehr dunkelblau verfärbt. Um diese Circulationsstörung zu heben, sollte man die Naht lösen, doch hindert hieran die Ueberlegung, dafs darnach der transplantierte Lappen sich stark zurückziehen würde. Doch wird eine Entspannungsnaht gelöst. Temp. Morgens 38,3. Abends 38,7.

6. VI. Status idem. Temp. 38,2, resp. 38,3.

7. VI. Patient befindet sich wohl. Der erwähnte Hautrand ist vollkommen gangraenös geworden, sieht schwarz aus

und beginnt sich zu demarquieren. Temp. Morgens 37,0. Abends 38,0.

8. VI. Der Hautrand wird entfernt, und damit sich der transplantierte Lappen nicht allzu stark zurückzieht, wird eine starke Entspannungsnaht angelegt. Temp. Morgens 37,5, Abends 37,8.

12. VI. Patient nährt sich recht gut. Der Defekt der linken Wange verkleinert sich durch Hereinziehung der benachbarten Haut. Dadurch wird die linke Oberlippe, soweit dieselbe noch vorhanden ist, nach oben verzogen. Temp. Morgens 36,7. Abends 37,6.

20. VI. Patient ist bisher fieberfrei. An der Stelle, an welcher der transplantierte Hautlappen gangraenös wurde, liegen zwar die Hautränder gut aneinander in Folge der Entspannungsnaht, auch zeigen sie Granulationen, aber keine Tendenz zur Verwachsung. Sie werden deshalb in Chloroformnarkose angefrischt und mit einander vereinigt. Entspannungsincision. Silberplattennaht; fünf Silberdrahtnähte.

22. VI. Befinden sehr gut. Temperatur Morgens 37,0, Abends 37,8.

26. VI. Bisher vollständig fieberfrei. Der Wangendefekt verkleinert sich immer mehr. Die neulich angefrischten Hautränder beginnen mit einander zu verheilen.

28. VI. Die Silbernähte werden entfernt, nachdem die Hautränder verwachsen sind. Die Silberplattennaht bleibt jedoch noch liegen.

30. VI. Patient ist geheilt, d. h. der transplantierte Lappen ist in feste Verbindung mit der Nachbarschaft getreten. Auf der linken Wange besteht nur noch ein circa 2 Markstücke großer Hautdefekt, an dessen Stelle sich frische Granulationen befinden. Das untere Augenlid ist ein wenig nach unten und der Rest der linken Hälfte der Oberlippe durch Narbencontraction nach oben verzogen. Eine vollständige Uebernarbung des Defektes dürfte in 10—14 Tagen zu erwarten

stehen. Indefs wünscht Patient der Kosten halber schon früher in seine Heimath zurückzukehren, und steht somit seiner Entlassung in den nächsten Tagen Nichts im Wege.

Epikrise:

Der ganze Verlauf der Krankheitsgeschichte und der heutige Zustand des Patienten geben uns die Berechtigung, die eingeschlagene Operationsmethode als eine vollkommen gelungene zu bezeichnen. Wenn freilich auch nicht mit Still-schweigen übergangen werden können die wenigen Unannehmlichkeiten, welche in den Tagen nach den beiden operativen Eingriffen auftraten, so müssen wir doch einfach bekennen, daß selbige Eventualitäten sind, welche bei jeder Operation, selbst unter Anwendung der strengsten Antiseptik vorkommen können. Ich meine einmal das Auftreten des Erysipels und fernerhin das theilweise Gangraenoswerden des transplantierten Lappens. Ja selbst wenn es in unserer Macht gestanden hätte, den ersten Akt der Operation unter antiseptischen Cautelen auszuführen, so hätten wir doch nicht mit Gewissheit sagen können, es werde ein Erysipeles traumaticum nicht auftreten. Da selbiges eine Dermatitis ist, welche stets auf Infection beruht (Billroth), so können wir ein Entstehen derselben nicht mit positiver Sicherheit verhindern, da wir bis heute nicht im Stande sind zu wissen, ob und in wie weit wir alle und jegliche Infectionskeime vernichtet haben. Ausserdem aber müssen wir bedenken, daß, selbst wenn wir auf das peinlichste die Wunde desinficirt haben, doch noch eine Infection dem Kranken von einem Entzündungs- oder Fäulnissherd zugehen kann, welchen er selbst an sich trägt.

Was die zweite Unannehmlichkeit betrifft, das theilweise Gangraenoswerden des transplantierten Lappens, so ist selbiges Vorkommniß bei plastischen Operationen im Allgemeinen nicht allzu selten. Als Grund hierfür in unserem Falle müssen wir dreierlei anführen, einmal den Umstand, daß die Haut in

der Gegend des Augenlides schon von vornherein sehr schlecht ernährt ist, ferner die Länge des gebildeten Lappens und endlich den Einfluss der nicht zu umgehenden Naht. Es leuchtet klar ein, dass die Ernährung der vom Stile des Lappens so weit entfernten Partie eine nur sehr mangelhafte sein kann. Dass dieselbe fast völlig unterbrochen, ja selbst ganz aufgehoben werden kann, wie es bei unserem Kranken eintrat, muss man ohne Zweifel der einschnürenden Wirkung der Naht beimeessen. Wie aber unser Fall zeigt, hat das Absterben der Randpartie des Lappens keinen sehr nachtheiligen Einfluss ausgeübt, es sei denn, dass der nochmalige kleine operative Eingriff ein grosses Uebel gewesen sei.

Wir können also sagen, dass bei herabgekommenen oder alten Individuen mit malignen Neubildungen im Gesichte eine Operation in zwei Zeiten, wie sie in vorliegendem Falle ausgeführt wurde, ihre vollberechtigte Indication hat.

Zum Schlusse möge es mir gestattet sein, Herrn Geheimrath Professor Ritter von Nufsbaum für die gütige Ueberlassung des vorliegenden Falles meinen innigsten Dank auszusprechen. Auch dem Herrn Assistenten Dr. Paffet sage ich an dieser Stelle für seine mir in so liebenswürdiger Weise zu Theil gewordene Unterstützung meinen besten Dank.
